



K.5.S1.E.4b

Test sur les ITS - corrigé

Vrai ou faux?

- | | |
|--|-------------|
| 1. Une personne peut avoir une infection transmise sexuellement (ITS) sans le savoir. | <u>VRAI</u> |
| 2. Il est normal pour les femmes d'avoir des pertes vaginales. | <u>VRAI</u> |
| 3. Une personne qui a déjà contracté une ITS et a été traitée ne peut pas l'attraper à nouveau. | <u>FAUX</u> |
| 4. Le VIH est présent surtout dans le sperme, le sang, les sécrétions vaginales, le lait maternel. | <u>VRAI</u> |
| 5. La chlamydie et la gonorrhée peuvent causer une infection pelvienne. | <u>VRAI</u> |
| 6. Une femme enceinte qui a contracté une ITS peut la transmettre à son fœtus ou au nouveau-né. | <u>VRAI</u> |
| 7. La plupart des ITS guérissent en l'absence de traitement si l'on attend assez longtemps. | <u>FAUX</u> |
| 8. Les ITS qui ne sont pas traitées peuvent provoquer la stérilité. | <u>VRAI</u> |
| 9. Les contraceptifs oraux offrent une excellente protection contre les ITS. | <u>FAUX</u> |
| 10. Les condoms peuvent aider à prévenir la transmission des ITS. | <u>VRAI</u> |
| 11. Si l'on connaît bien son partenaire, on ne peut pas attraper d'ITS. | <u>FAUX</u> |
| 12. La chlamydie est l'ITS la plus commune. | <u>VRAI</u> |
| 13. Les personnes sexuellement actives devraient consulter un médecin et passer un test de dépistage d'ITS une fois par année. | <u>VRAI</u> |

Réponse brève

14. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui pense avoir une ITS?
Se rendre à une clinique qui traite les ITS ou consulter un médecin à son bureau pour passer des tests de dépistage.
15. Comment peut-on éviter de contracter une ITS?
S'abstenir d'avoir des relations sexuelles, s'adonner à des activités à faible risque pour la santé sexuelle, utiliser un condom chaque fois que l'on a des relations sexuelles, se faire vacciner contre l'hépatite B et refuser de partager des aiguilles.